

Pozdně letní žír klikoroha borového – v současném suchém počasí, kdy značná část letošní výsadby jehličnanů je oslabena suchem, bylo zaznamenáno v některých oblastech letní rojení klikoroha borového. Je proto nutné v současnosti sledovat výskyt brouka na ohrožených lokalitách a neprodleně provádět kurativní ošetření postřikem ohrožených kultur.

Kalamitní výskyt podkorního hmyzu - pozornost je nutné věnovat rovněž již napadené hmotě podkorním hmyzem na lokalitách, které nejsme schopni v krátké době odvézt z porostů. V případě, že napadenou hmotu kůrovcem nejsme schopni v krátkém termínu odvézt z porostů, budeme nuceni přistoupit k asanaci napadeného dřeva odkorněním, případně postřikem insekticidními přípravky.

V současné době jako nejvhodnější insekticid lze doporučit přípravek s obsahem účinné látky alpha-cypermethrin např. Alfametrin ME, Vaztak Aktive (povoleno v rámci PEFC) .

Použití a dávkování přípravku Alfametrin ME a Vaztak Aktive (registrace).

Škodlivý organizmus

Dávkování

Poznámka

Klikoroh borový

1%

máčení max 1x

Lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci na smrku

0,6%

preventivně max. 1x

Lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci na smrku

1%

sanace/příprava lapáků max. 1x

Cena přípravků:

Alfametrin ME 632 Kč/l nyní cena 590 Kč/l při odběru 12l a více cena 575 Kč/l

Vaztak Aktive 750 Kč/l

Přípravky jsou v dostatečném množství zajištěny ve skladech spol. MERCATA LES

V případě potřeby se obraťte na naše regionální specialisty, kteří zajistí komplexní poradenskou službu přímo na vašich pracovištích (dávkování, seřízení aplikační techniky, dodávky).

-