Actiflow® Mn500

AE03286

Dávkování a podmínky používání:

plodina	dávka	poznámka
Obiloviny	1 - 2 l/ha maximální koncentrace 1 %	1-2 aplikace od stadia 2. listu až do prvého kolínka
Kukuřice	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikace ve fázi 4-8 listů
Řepka a brukvovité	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikace ve fázi 4-6 listů
Luskoviny	0,5 - 1 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace ve fázi 4 - 6 listů
Cukrovka	1 - 2 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace ve fázi 4-6 listů
Brambory	1 - 2 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace 2-3 týdny po vzejití
Listová zelenina, kořenová zelenina	1 - 2 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace ve fázi 10 - 15 cm
Jádroviny	1 - 2 l/ha maximální koncentrace 1 %	Nedostatek: 1 aplikace před kvetením, a 1 aplikace po odkvětu. Na zelených odrůdách zlepšuje zelené zbarvení; 6 aplikací od stadia vývoje plodů po dobu 1 měsíce. Aplikační dávky lze opakovat od fáze nasazení plodů až 1 měsíc před sklizní na základě analýzy.
Peckoviny	1 - 2 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace od nasazení plodů další dle potřeby (analýza).
Vinná réva	1 - 2 l/ha maximální koncentrace 1 %	1 aplikace odstění pupenů s jedním opakováním až do tvorby bobulí.

NÁVOD K POUŽITÍ Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až dokud z povrchu plodiny nezačne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28° C. Vhodná teplota aplikací 6 – 25 °C. Velmi mladé listy a plodiny, které jsou ve stresu můžou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně prodlužte aplikační interval. Vzájemné plodinové doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy až po práškových produktech. Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

LIKVIDACE Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění vypláchněte tři krát čistou vodou. Vypláchovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Prázdný obal nespalujte a nepoužívejte žádným k jiným účelům.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY: Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí:

> Při používání nejezte, nepište ani nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si omyjte ruce a obličej.

> První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo přibalového letáku.

> Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci:Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

> Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno tepluou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

> Při zasažení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vypláchněte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

> Při náhodném požití:Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá ikt křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402.

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění oči: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje: alkohol ether fosfát; neiontové povrchové aktivní látky (CAS: 61791-26-2)

Dávkovanie a podmienky používania:

plodina	dávka	poznámka
Obilniny	1 – 2 l/ha Minimálna koncentrácia 1 %	1-2 aplikácie od štádia 2. listu až do prvého kolienka
Kukurica	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia vo fáze 4-8 listov
Repka a kapustovité	1 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia vo fáze 4-6 listov
Strukoviny	0,5 - 1 l/ha maximálna koncentrácia 1 %	1 aplikácia vo fáze 4-6 listov
Cukrová repa	1 - 2 l/ha maximálna koncentrácia 1 %	1 aplikácia vo fáze 4-6 listov
Zemiaky	1 - 2 l/ha maximálna koncentrácia 1 %	1 aplikácia 2-3 týždne po vzídení
Listová zelenina, koreňová zelenina	1 - 2 l/ha maximálna koncentrácia 1 %	1 aplikácia vo fáze 10 - 15 cm
Jadroviny	1 - 2 l/ha maximálna koncentrácia 1 %	Nedostatok: 1 aplikácia pred kvitnutím, a 1 aplikácia po odkvitnutí. Na zelených odrodách zlepšuje zelené sfarbenie: 6 aplikácií od štádia vývoja plodov počas 1 mesiaca. Aplikačne dávky môžu byť opakované od fázy nasadenia plodov až 1 mesiac pred zberom na základe analýzy.
Kôstkoviny	1 - 2 l/ha maximálna koncentrácia 1 %	1 aplikácia od nasadenia plodov ďalšie podľa potreby
Vinič	1 - 2 l/ha maximálna koncentrácia 1 %	1 aplikácia vo fáze oddelenie pupeňov s jedným opakovaním až do tvorby bobúľ.

NÁVOD NA POUŽITIE Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postreku v čase silného slnečného žiarenia a / alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28° C. Teplota vhodná na aplikáciu 6 - 25 °C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používajte nižšie dávky a primerene predĺžte aplikačný interval. Vzájomné odporúčania pre aplikačné dávky a termíny aplikácií pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenom prostredí.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY

1. Nádrž postrekovača naplňte polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešacie zariadenie. 2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie zariadenie ponechajte zapnuté. Pri miešaní z ďalšími zložkami tank-mix zmes, tento produkt pridávajte vždy až po práškových produktoch. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia. 3. Po postreku dôkladne vyčistite a opláchnite postrekovač.

LIKVIDÁCIA Nevyleievajte do kanalizácie; Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Oplachovú vodu použite na prípravu aplikačnej zmesi. Prázdne obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

UPOZORNENIE: Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručujú, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto hnojiva nebudú akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka a životného prostredia.

> Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev, gumové alebo plastové rukavice a ochranné prostriedky na očí/tvár. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte výpary/aerosól. Po skončení práce si umyte ruky a tvár.

> Prvá pomoc. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

> Pri nadýchaní prachu/aerosólu pri manipulácii/aplikácii: Prerušte expozíciu, zabezpečte postihnutému telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

> Pri zasiahnutí pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Časti tela, ktoré boli zasiahnuté hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

> Pri zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach vypláchujte, najmä priestory pod viečkami, čistou podľa možnosti vlažnou tečúcou vodou 10-15 minút. Ak pretrvávajú oriznaky (sčervenanie, pálenie) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).

> Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej orvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s nasou dalej uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

POZOR

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Nepoužívajte, kým si nepreštudujete a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/mhly/pár/aerosolov.

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak podráždenie oči pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Obsahuje: alkohol éter fosfát; neiónové povrchovo aktívne látky (CAS: 61791-26-2)